



BEZPLATNÉ OČKOVÁNÍ PROTI HPV!

(Běžná cena: 600 Euro)

- lidské papilomaviry (HPV) mohou způsobovat rakovinu děložního čípku a vznik genitálních bradavic
- vzhledem k vysokému počtu sexuálních partnerů patří sexuální pracovníci k rizikové skupině
- zapotřebí jsou 3 očkovací dávky v průběhu jednoho roku
- celoživotní ochrana (bez nutnosti přeočkování)
- doporučeno pro ženy a muže od 9 let věku
- během těhotenství a horečnatého onemocnění nelze očkovat
- žádný vliv na antikoncepční pilulky
- stěry prováděné u gyneloga/gynekoložky jsou přesto důležité

Za příspěvek na úhradu nákladů spojených s očkováním ve výši 10-15 Euro za očkovací dávku bychom byli vděční.

Termíny:

St, 15.02.	14-16h	Út, 14.03.	15-17h
Čt, 23.02.	15-17h	St, 22.03.	14-16h
St, 08.03.	15-17h	St, 29.03.	14-16h

Kde?

SOPHIE BeratungsZentrum für Sexarbeiterinnen
Oelweingasse 6-8, 1150 Wien
Tel.: 01 8975536

Prosíme o telefonickou rezervaci termínu.

GARDASIL HPV-očkovací látka

Nenechávejte se očkovat, pokud:

- jste alergická nebo citlivě reagujete na některou ze složek vakcíny
- jste nebo mohla byste být těhotná
- jste onemocněla a máte vysokou horečku

Po dohodě s lékařem, pokud:

- trpíte poruchou krevního srážlivosti
- je Váš imunitní systém oslaben (např. HIV, silné léky, vrozená nemoc, atd.)

Následující vedlejší účinky se mohou vyskytnout:

U 10% očkovaných: bolest, otok nebo zarudnutí v místě vpichu, bolesti hlavy

U 1% očkovaných: krevní výron nebo svědění v místě vpichu, bolesti postižené končetiny, horečka, nevolnost

U 0.1% očkovaných: Kopřivka

U 0.01% očkovaných: dýchací potíže

Ještě zřídkaěji: bezvědomí, zatuhnutí, záškuby svalů, svalová slabost, mravenčení v pažích a nohách, zmatenost (Guillain-Barré-Syndrom), mdloby, zvracení, boestli svalů a kloubů, neobvyklá únava nebo slabost, zimnice, zrychlená tvorba modřin a krvácení, kožní infekce v místě vpichu.